

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਟੈਮੀ ਫਲੂ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਮੀ ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੇਠ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੈ। ਟੈਮੀ ਫਲੂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਲਛਣ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣ। ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸੈਲਾ ਜਿਹਾ ਸਫੇਦ ਪਾਊਡਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1. ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਇਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ
- ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ) ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
 - ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਮੁਰੱਬਾ (ਸ਼ਕਰ ਰੋਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ)
 - ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਮਿਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ (ਸ਼ਕਰ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ)
 - ਚੰਗੀ ਗਾੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ (ਆਮ ਖੰਭ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੀ)
 - ਸੁਨਿਹਰੀ ਚਾਸ਼ਨੀ
 - ਮਿੱਠਾ ਨੀਮ ਖੋਏ ਵਰਗਾ ਦੱਧ
 - ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਪਤਲਾ ਸ਼ਹਿਦ – ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਾ ਵਰਤੋ – ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕੁੜਤਨ ਆਵੇਗੀ।

2. ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

- ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
- ਇਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇਕ ਸਾਫ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ।
- ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੈਮੀ ਫਲੂ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪਾਵੋ।
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਹਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੁਲ ਜਾਵੇ।

3. ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ

ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਖਵਾਉ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇਵੋ।

15 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ।

15 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਟਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੋ ਬਾਕੀ ਸੁੱਟ ਦਿਉ।

40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋ।

ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੇ ਸਵਾਦੀ ਨਾਂ ਰਹੇ।

ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਦੇਵੋ

ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਅਗਸਤ 2009